Les polynômes

LES INCONTOURNABLES

Exercice 1 : [corrigé] *Équations avec des polynômes.* Déterminer les polynômes tels que : $(P')^2 = 4P$ où P est un polynôme réel.

Exercice 2 : [corrigé] Soit n un entier naturel, a, b deux éléments de $\mathbb{K}$ tels que $a \neq b$. Déterminer le reste de la division euclidienne de $A_n = X^n$ par $B = (X - a)$, puis par $C = (X - a)(X - b)$, puis par $D = (X - a)^2$.

Exercice 3 : [corrigé] Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(Q 1) Montrer que $(A - I_2)(A - 3I_2) = 0_{22}$.

(Q 2) Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $(X - 1)(X - 3)$.

(Q 3) En déduire la valeur de A^n .

Exercice 4 : [corrigé] Factoriser (dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$) les polynômes :

(Q 1) $(X^2 - X + 1)^2 + 1$; (Q 2) $X^9 + X^6 + X^3 + 1$; (Q 3) $X^6 - 5X^4 + 19X^2 + 25$.

Exercice 5 : On considère les polynômes

$$\begin{aligned} A &= X^9 - X^8 - 4X^7 + 7X^6 + X^5 - 10X^4 + 6X^3 + 3X^2 - 4X + 1 \\ B &= X^5 - X^4 - 2X^3 + 2X^2 + X - 1. \end{aligned}$$

Factoriser B et démontrer qu'il divise A .

Exercice 6 : [corrigé]

(Q 1) Montrer que si $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et si $\forall i \in \{0; \dots; n\}, P(i) = 0$ alors $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$.

(Q 2) Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que si $\forall x \in [0; 1], P(x) = Q(x)$ alors $P = Q$.

Exercice 7 : [corrigé] Soit $P = (X + 1)^n - 1, n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

(Q 1) Calculer les racines de P puis donner la factorisation de P ainsi que de $x \mapsto \frac{P(x)}{x}$.

(Q 2) En déduire que $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$.

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 8 : [corrigé](Q 1) Soit $n \geq 1$. On considère un polynôme P de degré n . Déterminer le degré des polynômes : $Q = X^2P' + P$ et $R = XP' + P$.(Q 2) On considère la suite de polynômes définies par : $H_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, H_{n+1} = H'_n - 2XH_n$.(Q a) Déterminer $H_1; H_2; H_3$.(Q b) Déterminer le degré de H_n et son coefficient dominant, pour $n \in \mathbb{N}$.**Exercice 9 :** [corrigé] *Équations avec des polynômes.* Déterminer les polynômes tels que :(Q 1) $P \circ P = P$ (Q 2) $Q^2(X) = XP^2(X)$ où P et Q sont deux polynômes réels.**Exercice 10 :** [corrigé] Effectuer la division euclidienne de A par B dans les cas suivants :(Q 1) $A = X^6 + 1,$
 $B = X^3 + X^2 + X + 1$ (Q 4) $A = X^5 + iX^4,$
 $B = X^2 + 1$ (Q 2) $A = 2X^4 - 11X^3 + 7X^2 + 6X - 2,$
 $B = 2X^2 - 5X + 2$ (Q 5) $A = 2X^3 - (1+i)X^2 - iX - (1-i),$
 $B = iX + 1$ (Q 3) $A = X^{20} - 2X^{15} + 3X^{10} - 4X^5 + 5,$
 $B = X^7 + X^2$ (Q 6) $A = iX^4 - X^3 + 2iX + 1,$
 $B = (1-i)X^2 + iX + 1 + i.$ **Exercice 11 :** [corrigé] Soit n un entier naturel, θ un réel, tels que $a \neq b$. Déterminer le reste de la division euclidienne de :(Q 1) $A_n = ((\sin \theta)X + \cos \theta)^n$ par $B = X^2 + 1$ (Q 2) $A_n = X^{2n} + X^n + 1$ par $B = X^2 + X + 1$ **Exercice 12 :** [corrigé] Factoriser (dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$) les polynômes :(Q 1) $X^4 + X^2 + 1;$ (Q 3) $X^5 - 4X^3 + 10X^2 - 13X + 6;$ (Q 2) $X^8 + X^4 + 1;$ (Q 4) $X^{2n} - 2 \cos(n\theta)X^n + 1.$ **Exercice 13 :** [corrigé] Soit $P = (X + 1)^7 - X^7 - 1$. Déterminer deux racines entières de P ainsi que leurs multiplicités. Vérifier que j est racine de P . En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$.**Exercice 14 :** [corrigé] Soit $n \geq 3$. Démontrer que $1 - nX + X^n$ n'a que des racines simples.**Exercice 15 :** (*) Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{R}[X]$ tel que $P(X^2) = P(X)P(X - 1)$.(Q 1) Montrer que si a est une racine éventuellement complexe de P alors a^2 et $(a + 1)^2$ sont aussi des racines de P .(Q 2) En déduire que (a^{2^n}) et $((a + 1)^{2^n})$ sont des racines pour tout entier $n \geq 1$.(Q 3) Montrer que 0 n'est pas racine de P .(Q 4) En déduire que si a est une racine de P alors $|a + 1| = |a| = 1$.(Q 5) En déduire les racines de P et la forme de P .**Exercice 16 :** [corrigé] En utilisant les relations coefficients racines disponibles sur les polynômes, trouver deux complexes x, y dans chacun des cas suivants :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ xy = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ xy = 2 \end{cases}$$

$$\frac{3^n - 1}{2}A + \frac{3 - 3^n}{2}I_2$$

Indications

Correction de l'exercice 1 :

On fait une disjonction des cas.

- Si $\deg(P) \leq 0$, c'est à dire P est constant, alors : $P' = 0$ donc : $(P'^2) = 4P \Leftrightarrow P = 0$.
- Si $\deg(P) \geq 1$, alors $\deg((P')^2) = 2\deg(P') = 2(\deg(P) - 1)$ et $\deg(4P) = \deg(P)$, d'où l'équation : $2(\deg(P) - 1) = \deg(P) \Leftrightarrow \deg(P) = 2$.

Réciproquement si P est de degré 2, donc de la forme : $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$, alors : $(P')^2 = (2aX + b)^2 = 4a^2X^2 + 4abX + b^2$ et $4P = 4aX^2 + 4bX + 4c$ et donc :

$$4a^2X^2 + 4abX + b^2 = 4aX^2 + 4bX + 4c \Leftrightarrow \begin{cases} 4a^2 = 4a \\ 4ab = 4b \\ b^2 = 4c \end{cases}$$

Or, $a \neq 0$ donc : $4a^2 = 4a \Leftrightarrow a = 1$, il nous reste donc $c = b^2/4$ et b est quelconque ce qui donne : $P = X^2 + bX + b^2/4$ avec $b \in \mathbb{R}$.

Correction de l'exercice 2 :

Si $n = 0$, $R = 1$. Soit $n \geq 1$. Le reste de la division euclidienne de $A_n = X^n$ par $B = (X - a)$ est $R = a^n$, puis par $C = (X - a)(X - b)$ est (avec $b \neq a$ implicitement) $R = \frac{b^n - a^n}{b - a}X + \frac{a^n b - ab^n}{b - a}$ puis enfin avec $D = (X - a)^2$ est $R = na^{n-1}X + (1 - n)a^n$. Pour ce dernier, il peut être utile de dériver A et $DQ + R$.

Correction de l'exercice 3 :

(Q1) $(A - I_2)(A - 3I_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0_{22}$.

(Q2) Par le théorème de la division euclidienne, il existe un unique couple (Q, R) de polynômes tels que : $\deg(R) < \deg((X - 1)(X - 3))$ et $X^n = Q(X - 1)(X - 3) + R$. On cherche R de la forme $aX + b$. On utilise les racines de $(X - 1)(X - 3)$ qui nous permettra de nous débarrasser du polynôme Q . On obtient le système linéaire :

$$\begin{cases} 1 = a + b \\ 3^n = 3a + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3^n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3^n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3^n - 1}{2} \\ \frac{3 - 3^n}{2} \end{pmatrix}$$

Le reste est donc le polynôme $\frac{3^n - 1}{2}X + \frac{3 - 3^n}{2}$.

(Q3) On substitue l'indéterminée X à A et on obtient $A^n = Q(A)(A - I_2)(A - 3I_2) + R(A) =$

Correction de l'exercice 4 :

(Q1) $(X^2 - X + 1)^2 + 1 = (X^2 - X + 1 - i)(X^2 - X + 1 + i)$
 Factorisons $(X^2 - X + 1 - i)$ (dans $\mathbb{C}$) Le discriminant est $\Delta = 1 - 4(1 - i) = -3 + 4i$. On cherche une racine carrée (dans $\mathbb{C}$) sous la forme $\omega = a + ib$. Nous obtenons $\omega^2 = a^2 - b^2 + 2aib$, soit $a^2 - b^2 = -3$ et $2ab = 4$. Cela ne suffit pas et il faut penser au module pour obtenir une condition supplémentaire : $|\omega|^2 = a^2 + b^2 = |\Delta| = 5$. Ainsi $2a^2 = 2 \Leftrightarrow a^2 = 1$ puis $2b^2 = 8 \Leftrightarrow b^2 = 4$. Enfin, $ab = 2 \geq 0$ et les deux racines carrées sont $1 + 2i$ et $-1 - 2i$. Finalement, $(X^2 - X + 1 - i) = (X - \frac{1+1+2i}{2})(X - \frac{1-1-2i}{2}) = (X - [1 + i])(X + i)$

Le travail est désormais fini. En effet, on pourrait penser à factoriser par la même méthode le polynôme $(X^2 - X + 1 + i)$, mais cela peut sembler long... Sinon on utilise que si $P \in \mathbb{R}[X]$ et si α est racine alors il en est de même de $\bar{\alpha}$. Finalement,

$$(X^2 - X + 1)^2 + 1 = (X - [1 + i])(X + i)(X - [1 - i])(X - i)$$

On regroupe les monômes conjugués l'un de l'autre :

$$(X^2 - X + 1)^2 + 1 = (X^2 + 1)(X^2 - 2X + 2)$$

(Q2) $X^9 + X^6 + X^3 + 1 :$

- Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$: on cherche α tel que : $\alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^3 + 1 = 0$. En posant : $\beta = \alpha^3$ nous nous ramenons à l'équation : $\beta^3 + \beta^2 + \beta + 1 = 0$ de racine évidente -1 . La factorisation donne alors : $X^3 + X^2 + X + 1 = (X + 1)(X^2 + 1) = (X + 1)(X + i)(X - i)$. Les valeurs de β sont donc : $\beta = -1, \beta = i$ ou $\beta = -i$.

Nous devons donc résoudre : $\alpha^3 = -1 \Leftrightarrow \alpha^3 = e^{i\pi} \Leftrightarrow \alpha = e^{i\pi/3}$ ou $\alpha = e^{i2\pi/3}$ ou $\alpha = e^{i4\pi/3}$.

De même : $\alpha^3 = i \Leftrightarrow \alpha^3 = e^{i\pi/2} \Leftrightarrow \alpha = e^{i\pi/6}$ ou $\alpha = e^{i5\pi/6}$ ou $\alpha = e^{i3\pi/2}$

et : $\alpha^3 = -i \Leftrightarrow \alpha^3 = e^{-i\pi/2} \Leftrightarrow \alpha = e^{-i\pi/6}$ ou $\alpha = e^{-i5\pi/6}$ ou $\alpha = e^{-i3\pi/2}$.

Au final, en notant : $\alpha_1 = e^{i\pi/3}, \alpha_2 = e^{i2\pi/3}$ et $\alpha_3 = e^{i4\pi/3}$, le polynôme étant de degré 9 avec 9 racines distinctes et de coefficient dominant égal à 1, nous avons :

$$\begin{aligned} X^9 + X^6 + X^3 + 1 &= (X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3)(X - \bar{\alpha}_1) \\ &\quad (X - \bar{\alpha}_2)(X - \bar{\alpha}_3)(X - i)(X + i)(X + 1) \end{aligned}$$

- Pour en déduire la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ il nous faut constater que $(X - \alpha_1)(X - \bar{\alpha}_1) = (X^2 - 2\text{Re}(\alpha_1)X + |\alpha_1|^2)$ ce qui donne :

$$\begin{aligned} X^9 + X^6 + X^3 + 1 &= (X + 1)(X^2 + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1) \cdot \\ &\quad (X^2 + \sqrt{3}X + 1)(X^2 - X + 1) \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 6 :

- Le polynôme est de degré au plus n et il a au moins $n + 1$ racines. Or il devrait en avoir au plus n sauf si c'est le polynôme nul. Ainsi, $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$.
- De même, $P - Q$ s'annule sur le segment $[0; 1]$, donc une infinité de fois. Seul le polynôme nul réalise cette condition et on en déduit que $P = Q$.

Correction de l'exercice 7 :

(Q 1) $P(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (\alpha + 1)^n = 1 \Leftrightarrow \alpha = -1 + e^{i2k\pi/n}$ avec $k \in \{0; \dots; n\}$. Après factorisation par l'angle moitié, nous obtenons l'ensemble des racines pour ce polynôme :

$$\{2ie^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n); k \in \{0; \dots; n\}\}$$

Puisque 0 est racine de P , la fonction $x \mapsto \frac{P(x)}{x}$ est également polynomiale et admet comme racines :

$$\{2ie^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n); k \in \{1; \dots; n\}\}$$

(Q 2) On pose $P = X \prod_{k=1}^n (X - 2ie^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n))$. D'autre part, par le Binôme de Newton,

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k - 1 = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} X^k \\ &= X \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} X^{k-1} \right) = X (X^{n-1} + \dots + n). \end{aligned}$$

Nous obtenons alors

$$\prod_{k=1}^n (X - 2ie^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n)) = (X^{n-1} + \dots + n).$$

Par relation coefficients-racines, nous avons :

$$\prod_{k=1}^n (2ie^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n)) = (-1)^{n-1} \frac{n}{1}$$

Enfin,

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n 2ie^{ik\pi/n} &= (2i)^{n-1} e^{i \sum_{k=1}^{n-1} k\pi/n} \\ &= 2^{n-1} e^{i\pi(n-1)/2} e^{i(n-1)n\pi/(2n)} = 2^{n-1} (-1)^{n-1} \end{aligned}$$

La formule est

$$\prod_{k=1}^n (\sin(k\pi/n)) = \frac{n}{2^{n-1}}$$

Correction de l'exercice 8 :

(Q 1) Le polynôme P n'est pas constant et $\deg(P') \geq 0$. Donc $\deg(X^2 P') = 2 + \deg(P) - 1 = \deg(P) + 1 > \deg(P)$. Par propriété, $\deg(Q) = \deg(P) + 1$. $\deg(R) \leq \deg(P)$ car les deux polynômes ont le même degré. Cependant, $P = \sum_{n=0}^N a_n X^n$ et $XP' = \sum_{n=1}^N n a_n X^n$, soit $R = a_0 + \sum_{n=1}^N (n+1) a_n X^n$. On observe que $(N+1)a_N \neq 0$. Ainsi, $\deg(R) = \deg(P)$.

(Q 2) (Q a) $H_1 = -2X; H_2 = -2 + 4X^2; H_3 = 12X - 8X^3$.

(Q b) $\deg(H_n) = n$ et son coefficient dominant est

$$(-2)^n.$$

Correction de l'exercice 9 :

(Q 1) Avec étude du degré et analyse-synthèse : $P \circ P = P$: polynôme nul, de degré 0 et le polynôme X .

(Q 2) $Q^2(X) = XP^2(X) : Q = 0_{\mathbb{K}[X]} = P$.

Correction de l'exercice 10 :

(Q 1) $Q + X^3 - X^2, R = X^2 + 1$.

Correction de l'exercice 11 :

(Q 1) $R = \sin(n\theta)X + \cos(n\theta)$

(Q 2) De même, en utilisant $j = e^{i2\pi/3}$ et $\bar{j}$, on obtient : $R = 1 + 2 \cos(2n\pi/3)$. (avec $n \geq 1$).

Correction de l'exercice 12 :

(Q 1) $X^4 + X^2 + 1;$

(Q 2) $X^8 + X^4 + 1;$

(Q 3) $X^6 - 5X^4 + 19X^2 + 25$

(Q 4) Posons $P = X^5 - 4X^3 + 10X^2 - 13X + 6$. On constate que 1 est racine de P . De plus : $P'(1) = 0$ et $P''(1) \neq 0$. Ainsi 1 est racine de P d'ordre 2 ce qui mène à la factorisation :

$P = (X-1)^2(X^3 + 2X^2 - X + 6)$. On constate que -3 est également racine évidente de $X^3 + 2X^2 - X + 6$ ce qui mène à la factorisation :

$P = (X-1)^2(X+3)(X^2 - X + 2)$. Comme le trinôme $X^2 - X + 2$ a un discriminant négatif, cela donne la décomposition dans $\mathbb{R}[X]$. Les racines complexes de ce trinôme étant :

$\frac{1 - i\sqrt{7}}{2}$ et $\frac{1 + i\sqrt{7}}{2}$, la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ est donc :

$$P = (X-1)^2(X+3) \left(X - \left(\frac{1 - i\sqrt{7}}{2} \right) \right) \left(X - \left(\frac{1 + i\sqrt{7}}{2} \right) \right).$$

(Q 5) $X^{2n} - 2 \cos(n\theta)X^n + 1 :$

• Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$: on résout $\alpha^{2n} - 2 \cos(n\theta)\alpha^n + 1 = 0$. En posant $\beta = \alpha^n$ cela donne le trinôme : $\beta^2 - 2 \cos(n\theta)\beta + 1 = 0$. Ce-dernier a pour discriminant : $\Delta = -4 \sin^2(n\theta) = (2i \sin(n\theta))^2$. Nous avons donc pour racines : $\beta_1 = e^{in\theta}, \beta_2 = e^{-in\theta}$. Par ailleurs : $\alpha^n = e^{in\theta} \Leftrightarrow \alpha = e^{i\theta + 2k\pi/n}, k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ et de même :

$$\alpha^n = e^{-in\theta} \Leftrightarrow \alpha = e^{-i\theta + 2k\pi/n}, k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket.$$

Nous avons donc au final la factorisation :

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\theta + 2k\pi/n}) (X - e^{-i\theta + 2k\pi/n})$$

• La factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ s'obtient alors très vite car $e^{i\theta + 2k\pi/n} = e^{-i\theta - 2k\pi/n} = e^{-i\theta + 2(n-k)\pi/n}$ et car : $\prod_{k=1}^{n-1} (X - e^{-i\theta + 2k\pi/n}) = \prod_{k=1}^{n-1} (X - e^{-i\theta + 2(n-k)\pi/n})$. On en déduit donc :

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X^2 - 2 \cos \left(\theta + 2 \frac{k\pi}{n} \right) + 1 \right).$$

Ces dernières sont $\frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$. L'ensemble des solutions est $\{(1 + i; 1 - i); (1 - i; 1 + i)\}$.

Correction de l'exercice 13 :

- Le nombre 0 est racine. De plus, $P' = 7(X + 1)^6 - 7X^6$ et $P'(0) = 7$. Le nombre 0 est donc racine simple de P .
- Le nombre -1 est également racine simple ($P(-1) = 0$ et $P'(-1) = -7$.)
- Rappelons que j , racine troisième de l'unité, vérifie $j^3 = 1$ et $j^2 + j + 1 = 0$. Ainsi, $P(j) = (j + 1)^7 - j^7 - 1 = (-j^2)^7 - j - 1$ puisque $j^6 = (j^3)^2 = 1^2 = 1$. Ainsi, $P(j) = -j^{14} - j - 1 = -j^2 - j - 1 = 0$. Puis, $P'(j) = 7((j + 1)^6 - j^6) = 7((-j^2)^6 - 1) = 7 \times 0 = 0$. Ensuite, $P'' = 42((X + 1)^5 - X^5)$ et ainsi $P''(j) = 42((-j^2)^5 - j^5) = 42(-j - j^2) = 42$. Le nombre j est donc racine double.
- Puisque P est à coefficients réels, on sait que $\bar{j}$ est également racine double.
- Donc P est divisible par $X(X + 1)(X - j)^2(X - \bar{j})^2$, polynôme de degré 6.
- Or le degré de P est 6 et son coefficient dominant est $\binom{7}{6} = 7$:

$$P = \sum_{k=0}^7 \binom{7}{k} X^k - X^7 - 1 = \binom{7}{6} X^6 + \sum_{k=1}^5 \binom{7}{k} X^k$$

d'après la formule du binôme de Newton.

- Finalement,

$$P = 7 \times X(X + 1)(X - j)^2(X - \bar{j})^2 = 7X(X + 1)(X^2 + X + 1)^2$$

Correction de l'exercice 14 :

Supposons qu'il en existe au moins une, α . Alors, par propriété, α est racine de P et P' . Dérivons alors P . Nous obtenons $P' = n(X^{n-1} - 1)$. La racine α est donc une racine $n - 1$ ième de l'unité : $\alpha^{n-1} = 1$. Vis à vis du polynôme P cela donne : $0 = \alpha^n - n\alpha + 1 = \alpha - n\alpha + 1 = \alpha(1 - n) + 1$. Puisque $n \geq 3$, $\alpha = \frac{1}{n-1}$. Or ce dernier nombre n'est pas de module 1 et n'est donc pas une racine de l'unité. Voici donc la contradiction.

Correction de l'exercice 16 :

1. On sait que (x, y) sont racines de $P = X^2 - 0 \times X + 2 = X^2 + 2$. Ces dernières sont $\pm\sqrt{2}i$. L'ensemble des solutions est $\{(\sqrt{2}i; -\sqrt{2}i); (-\sqrt{2}i; \sqrt{2}i)\}$.
2. Remarquons que

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ xy = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x+y}{xy} = 1 \\ xy = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x+y}{2} = 1 \\ xy = 2 \\ x, y \neq 0 \end{cases}$$

De même, (x, y) sont racines de $P = X^2 - 2X + 2$.